

Fièvre Catarrhale



Maladie	Bactérienne ☐	Virale ☒	Parasitaire ☐	Autre ☐
Principales espèces animales touchées	Ovins essentiellement et bovins pour les animaux domestiques Cerfs, chevreuils, mouflons susceptibles d'être touchés pour les animaux sauvages.			
Zoonose (transmissible à l'Homme)	Oui ☐	Non ☒	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui ☒ Non ☐
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Très résistant dans le milieu extérieur		
	Au froid :	Sensible à la congélation		
	Au chaud :	Sensible à la cuisson		
	Aux agents chimiques :	Sensible aux composés phénolés		

DANS LA FAUNE SAUVAGE	
Maladie mortelle	En général, non
Symptômes	Souvent peu de symptômes. Mais avec le nouveau sous-type français (BTV8), on ne connaît pas l'effet sur la faune sauvage. Si l'animal bâve, a des lésions aux naseaux, dans la bouche, s'il est abattu, alerter SAGIR.
Organes atteints	Bouche, naseaux, yeux, poumons, tube digestif
Causes de la maladie	Virus de la famille des Reoviridés, genre <i>Orbivirus</i> Nombreux sous-types de virus. En France : sous-type BTV8, nouveau (venant du Nord) et BTV 1 qui vient du Sud de la Méditerranée . Transmission par insectes hématophages du genre <i>Culicoides</i>
Voies de contamination	Piqûre par un moucheron contaminé lors d'une piqûre précédente, sur un animal atteint. Une seule piqûre suffit !
Période(s) critique(s)	Au moment du développement des insectes vecteurs : pic en automne et un peu au printemps.
Prévention	désinsectisation

Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques Direct ☐ Indirect ☒	Oui ☒ Non ☐
	Voies de contamination Piqûre par un moucheron
	Espèces sensibles Ovins, Bovins : inflammation de la bouche, des yeux, des naseaux, boiterie, avortement, perte de lait, fièvre, abattement, maigreur, voire mortalité
	Prévention Désinsectisation Vaccination pour BTV1 et BTV8.
Risque de transmission aux chiens de chasse	Oui ☐ Non ☒
	Dangerosité
	Prévention

CHEZ L'HOMME
PAS DE TRANSMISSION